

forværre tics (eller somme tider sekundært bedre dem). Streptokok- eller andre infektioner kan forværre tics eller angst/OCD-symptomer som en del af en immunreaktion, der kaldes PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Strep).

#### H. ASPERGERS SYNDROM

Tony Attwood (2007) konkluderer, at 75% af mennesker med Aspergers syndrom har ADHD. Symptomer på Aspergers eller autismespektrumforstyrrelser inkluderer en forringet evne til at udnytte sociale signaler som kropssprog, ironi eller andre "subtekster" i kommunikationen, begrænset trang til at omgås andre, dårlig øjenkontakt, begrænset spektrum af encyklopædiske interesser, stædige gentagelser af samme besynderlige adfærd, belærende, monoton stemme, "konkret" tænkning, overfølsomhed over for visse stimuli samt usædvanlige bevægelser. Se de førende værker af Attwood (2007) og Bashe & Kirby (2001).

Tabel 3: ADHD versus bipolar affektiv lidelse. En sammenfatning af dr. Charles Poppers information som præsenteret i Papolos & Papolos (2006).

ADHD	Bipolar
Raserianfald forekommer, når barnet er overvældet.	Raserianfald forekommer, når barnet får et "Nej!"
Anfaldene varer mindre end en halv time.	Anfaldene kan vare i timevis.
Anfaldene er forholdsvis milde.	Anfaldene er voldsomme, ondskabsfulde, brutale, "går efter struben", eller er desorganiserede.
Barnet er som regel i en god sindsstemning, indtil det bliver overvældet, og bliver derefter lettere irriteret i korte perioder.	Stemningssvingninger: Går omkring i en langvarig irriteret tilstand, "klar til kamp", eller i en manisk, presset, ophidset tilstand.
Søvnproblemer er som regel begrænset til vanskeligheder med at falde i søvn. Vågner, før drømmene bliver uhyggelige.	Søvnproblemer inkluderer dårlig omsorg og livsstil og et begrænset søvnbehov. Drømme kan inkludere egentlige blod- og splatterscener.